



# La subida al Montsec

Enormes farallones calizos se elevan sobre nuestras cabezas, estamos en la vertiente sur del Montsec de Aragón. Un hábitat de aves rupícolas entre una vegetación de tipo mediterráneo. Con razón Montsec proviene de “monte seco”. Las encinas, pinos, enebros, sabinas y romeros visten el paisaje.

A partir de aquí iniciamos un constante ascenso que lleva a la cumbre del Montsec por el Pas de San Miguel, el acceso más oriental a la sierra del Montsec de Aragón. El nombre de este paso proviene de la arruinada ermita de San Miguel, que hemos dejado unos metros atrás.

## ESPECIES QUE SE PUEDEN OBSERVAR

El Montsec es un territorio de rocas y de rapaces. Conforme vamos ganando altura, aumentan las posibilidades de avistar ante nosotros los vuelos planeadores de las aves de presa. Estamos en el hábitat del águila real, el buitre leonado, el águila culebrera, el halcón peregrino y el quebrantahuesos.

**Águila real (*Aquila chrysaetos*)**  
Longitud: 75-95 cm  
Envergadura: 180-230 cm  
Residente

Como ocurre con la mayoría de rapaces, la hembra es mayor que el macho, pero en este ave la diferencia resulta más evidente: las hembras de águila real tienen una envergadura casi 30 cm mayor que los machos. Así pueden disponer de presas de tamaños diferentes y no tienen que competir por el alimento disponible en su territorio, que defienden todo el año y del que no salen nunca. Las parejas son de por vida. El majestuoso vuelo del águila real resulta un placer, más aún si se observa algún picado para cazar alguna presa. La velocidad en el descenso puede alcanzar los 250 km/h, solo superados por el halcón peregrino.



**Culebrera europea (*Circaetus gallicus*)**  
Longitud: 62-69 cm  
Envergadura: 160-175 cm  
Estival

Su alimentación se basa en culebras y víboras a las que da muerte tras aturdir las dando aletazos y un fuerte picotazo final en la nuca. Normalmente es un ave solitaria pero durante la migración invernal hacia África puede viajar en grupos numerosos, incluso en compañía de otras rapaces como el aguililla calzada. Cuando llega el celo, alrededor del mes de abril, el macho hace “regalos” a la hembra cazando para ella. Tiene una forma de vuelo característica: “pico a viento”, es decir, en contra del viento, logran aletear o planear quietas en el aire sin avanzar, para fijar con atención sus presas.



**Halcón peregrino (*Falco peregrinus*)**  
Longitud: 38-50 cm  
Envergadura: 90-115 cm  
Residente

Ostenta el record de velocidad del reino animal, pudiendo alcanzar los 300 km/h en sus fuertes picados cuando se lanza a la caza. Posee una especie de muesca o “diente” en su mandíbula superior que le sirve para matar a sus presas, habitualmente palomas, estorninos y córvidos, clavándola en su cuello a la vez que gira con rapidez. Con su habilidad y potencia de vuelo es capaz de abatir a su presa y capturarla en el aire sin que llegue a caer al suelo. Reconocible por su ancha “bigotera” y un aleteo muy rápido.



**Difícil de ver: Búho real (*Bubo bubo*)**  
Longitud: 57-75 cm  
Envergadura: 140-188 cm  
Residente

Es una de las rapaces más mortíferas, por su tamaño realmente grande y el sigilo con el que vuela por la noche, ya que dispone de plumas especiales que no hacen ruido al aletear. De día permanece oculto en la sombra de alguna sabina o en oquedades rocosas, ya que el miedo que produce en las aves diurnas hace que sea atacado por córvidos, milanos y otras rapaces para expulsarlo de sus territorios de reproducción. La mayor parte de su alimentación está basada en ratas, aunque tiene un gran abanico de presas posibles (roedores, pájaros, otras aves de presa, pequeños mamíferos...).



### Cómo identificar las aves

Ante todo, nos será muy útil la ayuda de una guía y unos prismáticos. Algunos de los datos generales que debemos tener en cuenta para poder identificar una especie son su tamaño, su silueta, posada o en vuelo, si emite algún sonido o canto. Según la época del año quizá podamos constatar si es un ave migratoria o residente. Otros detalles más concretos que completarán la definición de la especie son la forma y color del pico, las patas, la cola y las plumas. Cuantos más detalles apreciemos, más información tendremos para localizar correctamente el ave en cuestión.

### Distinguir siluetas de las grandes rapaces

Algunas diferencias:

• Las colas del quebrantahuesos y del alimoche son parecidas y tienen forma de rombo, aunque el tamaño del quebrantahuesos es prácticamente el doble



Quebrantahuesos

• El cuerpo del alimoche es blanco amarillento y tiene una cabeza pequeña con un pico alargado



Alimoche

• La cabeza del águila sobresale de forma redondeada y su cola es más larga que la del buitre. Tiene manchas blancas en las alas y en la cola



Águila real

• El cuello y la cabeza del buitre son blancos



Buitre

• El águila culebrera tiene las alas anchas, la cabeza grande y redonda y la cola redondeada



Águila culebrera