



Mapa de la RUTA



# El acantilado del Montsec

Nos encontramos en torno a los 1.300 m de altitud, en el lugar conocido como la "Pileta" del Montsec, donde antaño existió un viejo redil de ganado. En torno a esta cota la vegetación se compone principalmente de gramíneas, gayuba, boj, enebro y sabina negra. Poco a poco nos vamos aproximando a la cima del Montsec encaramados sobre los vertiginosos farallones de la sierra. Frente a nosotros se muestra el Montsec aragonés y catalán y el embalse de Canelles, en el río Noguera Ribagorzana. A nuestra espalda, unas magníficas vistas panorámicas de casi todas las cumbres pirenaicas.

### Difícil de ver:


**Roquero rojo** (*Monticola saxatilis*)

Longitud: 19 cm

Envergadura: 33-37 cm

Estival

Los machos son inconfundibles, con un llamativo pecho naranja y espalda azul cobalto. Es una especie estival que mantiene ciertas actitudes confiadas, lo cual facilita su observación. La hembra construye su nido en huecos de las paredes de roca que se encuentren cerca de praderas o matorrales y lo forra de hierba y musgo para evitar la fractura de los huevos con los salientes. Su principal alimento son mariposas diurnas, gusanos y caracoles. Sólo puede observarse en primavera y verano, entre abril y septiembre, migrando hacia África en invierno.



## ESPECIES QUE SE PUEDEN OBSERVAR

Contemplar el vuelo de los buitres y alimoches, es un privilegio único. Este es el dominio de las grandes rapaces, entre las que sobresale la presencia fugaz del **quebrantahuesos**, dominando los aires con su porte solitario y señorial. Desde marzo a octubre el silencio del Montsec de Aragón se ve roto por el rápido vuelo de los **vencejos reales**, a escasos metros de los caminantes.



**Quebrantahuesos** (*Gypaetus barbatus*)

Longitud: 100-120 cm

Envergadura: 240-290 cm

Residente / En peligro de extinción

Es una especie de buitre muy longeva: se calcula que puede vivir en torno a los 30 años y en cautividad ha llegado a superar los 40 años de edad. Hasta los 7 años aproximadamente no son adultos potencialmente reproductores, cambiando al menos 4 veces de plumaje hasta alcanzar el precioso negro azabache y naranja de los adultos. Come animales muertos y lanza los huesos sobre las rocas para romperlos y después comérselos (es una especie osteófaga). Es capaz de engullir patas de oveja, cabra o sarrío de hasta 20 cm de longitud. Fácilmente identificable por su "bigote", un mechón negro bajo el pico, del que proviene su nombre latino "barbatus", y por su cola en forma de "rombo".

**Alimoche** (*Neophron percnopterus*)

Longitud: 55-65 cm

Envergadura: 150-170 cm

Estival

Es el buitre más pequeño que habita en la península Ibérica. Llega desde África en febrero, para aparearse y hacer su puesta, y vuelve a migrar hacia el sur en septiembre. Su cabeza es pequeña, de un tono amarillento, con un largo y delgado pico muy destacado. Gracias a él logra sacar los trozos de tendones y músculos pegados a los huesos y carroñas con suma paciencia. Su cola tiene la característica forma de cuña, similar a la del quebrantahuesos.




**Vencejo real** (*Apus melba*)

Longitud: 21 cm

Envergadura: 57 cm

Estival

Suele observarse en grupos sobrevolando zonas de cortados en alta y media montaña. Captura sus presas, principalmente mosquitos, mientras vuela y emite unos increíbles chillidos a gran velocidad. Su morfología alar, con largas alas arqueadas, le permite realizar vuelos imposibles a una velocidad de vértigo. Para alimentar a sus crías acumula varios insectos en su pegajosa boca y durante breves segundos se posa en el nido, alimenta a los pollitos y vuelve a buscar más. El sistema de captura consiste en dejar abierta su gigantesca boca mientras vuela pasando entre las nubes de mosquitos para que se cuelen hasta su "buche", donde se acumulan.



### Difícil de ver:

**Roquero solitario** (*Monticola solitarius*)

Longitud: 22 cm

Envergadura: 33-37 cm

Residente

Su hábitat principal son los roquedos cercanos a los ríos, y en ocasiones puede ocupar construcciones en los núcleos urbanos. Su alimentación está basada tanto en insectos como en semillas y frutos, en función de la disponibilidad, pero también puede capturar pequeños vertebrados como lagartijas, esperando al acecho, con suma paciencia e inmóvil. Su color cobalto intenso hace de este pájaro uno de los más bonitos de la península Ibérica, pero apenas permanece unos segundos en el posadero antes de alzar el vuelo, así que no es fácil observarlo.



### Curiosidades

¿SABÍAS QUE...?

El vencejo posee unas alas muy grandes y unas patas muy cortas en relación a su tamaño corporal, por lo que tiene grandes dificultades para alzar el vuelo desde tierra. En sus garras posee una gran fuerza que le permite asirse al nido sin necesidad de aterrizar. Pero lo más increíble es su capacidad para pasar más de un año sin parar de volar, satisfaciendo todas sus necesidades biológicas en pleno vuelo: capturar insectos, beber, bañarse o dormir. Y además, el **vencejo real** es el tercer ser vivo más rápido de la naturaleza tras el halcón peregrino y el águila real, llegando a alcanzar velocidades de 200 km/h.

