



## INTRODUCCIÓN

Sobrarbe y La Ribagorza son dos comarcas altoaragonesas que ocupan la mitad nororiental de la provincia de Huesca y que limitan, al norte, con Francia. Son dos territorios pirenaicos, instalados en la parte central y más elevada de la cordillera, donde se elevan el Aneto (3.404 m), el Posets o Llardana (3.369 m) y el Monte Perdido (3.348 m), las tres cimas principales de los Pirineos. A este universo de tresmiles, se suman unas sierras y valles prepirenaicos que introducen multitud de matices montañoses.

Las 10 rutas ornitológicas promovidas por el Centro para el Desarrollo de Sobrarbe y La Ribagorza (CEDESOR) pretenden dar a conocer buena parte de este rico patrimonio natural, a través de 10 itinerarios que muestran los diferentes hábitats donde observar las aves más emblemáticas de estos valles y montañas.

Las «10 rutas ornitológicas por Sobrarbe y La Ribagorza» están pensadas para facilitar el encuentro con la naturaleza y sus aves a la inmensa mayoría de visitantes. Son recorridos fáciles, que requieren de 1 a 3 horas de marcha a pie, perfectamente señalizados e interpretados con mesas y paneles informativos y a los que esta publicación invita a acercarse. Bosques, cortados, riberas, humedales, prados, cultivos... son el marco idóneo para lograr un encuentro con el magnífico quebrantahuesos, la poderosa águila real, el etéreo treparriscos o escurridizo trepador azul.



Con las aves como protagonistas, esta publicación y el mapa que le acompaña son una invitación a sumergirse en el rico patrimonio natural de Sobrarbe y La Ribagorza, y también a recorrer estas tierras envueltas por el sublime paisaje del Pirineo aragonés.

# Bujaruelo




RUUTA 1

## Ficha técnica

- Hábitat ornitológico elegido:** ríos y sotos de montaña; prados y bosquetes de piso montano húmedo
- Comarca:** Sobrarbe
- Municipio:** Torla
- Longitud del itinerario:** 3 km 500 m
- Tiempo:** 1 h
- Altitudes:** Mesón de San Nicolás de Bujaruelo (1.340 m) y Puente de Oncins (1.370 m)
- Desnivel acumulado:** 30 m de subida y 30 m de bajada
- Tipo de sendero:** la margen izquierda del río Ara se encuentra señalizado como GR 11

- Avifauna característica:** piquituerto, camachuelo común, verderón serrano, bisbita alpino, bisbita arbóreo, acentor alpino, chova piquigualda, roquero rojo, quebrantahuesos, mirlo acuático, mirlo capiblanco, gorrión alpino, perdiz pardilla, perdiz nival, treparriscos, trepador azul, agateador norteño, becada, águila real, collalba gris, azor...

El comienzo y final de la ruta se sitúan al lado del fotogénico puente medieval de Bujaruelo, valle al que se accede desde Torla, desviándose de la carretera que lleva al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Discurre por el piso montano húmedo, entre praderas o «fenales» flanqueados por rodales de tejos y pinos silvestres, en el tramo de la margen izquierda del Ara (GR 11), y bosques de pino silvestre con tejos, en la pista de la margen derecha. El hábitat de ribera está presente en todo momento, ya que la ruta circular discurre cerca de las orillas del río Ara.



## Los prados o «fenales»

Los dos ecosistemas más interesantes en este tramo del río Ara se alternan constantemente: los prados o «fenales» del piso montano húmedo y la vegetación de ribera que acompaña a las aguas del Ara. En los prados hay rodales dispersos de tejos y de pinos silvestres que acogen multitud de aves medianas y pequeñas de montaña, que son las protagonistas de la ruta. Por encima, las grandes montañas del Pirineo muestran los cambios de vegetación que la altitud provoca.



### Piquituerto común (*Loxia curvirostra*)

Longitud: 16-17 cm  
Envergadura: 27-30 cm  
Residente

Su pico cruzado está adaptado para abrir piñas y extraer piñones



### Camachuelo común (*Pyrrhula pyrrhula*)

Longitud: 15 cm  
Envergadura: 22-26 cm  
Estival

Los machos deslumbran por el cuello, garganta y pecho color salmón



### Verderón serrano (*Serinus citrinella*)

Longitud: 11-13 cm  
Envergadura: 18-20 cm  
Residente

Sociable, ruidoso y asociado a la media montaña



### Acentor alpino (*Prunella collaris*)

Longitud: 16-19 cm  
Envergadura: 22 cm  
Estival

Discreto, sólo se ve en alta montaña

## Las praderas de Laña Larga

Otro buen ejemplo de prados o «fenales» son las praderas de Laña Larga. Rodeadas de grandes bojales, serbales y tejos y cercanas al Ara, posibilitan el encuentro con las pequeñas aves ligadas a los prados húmedos y a las orillas del río. También se pueden contemplar las majestuosas montañas del entorno, donde los pisos bioclimáticos van sucediéndose. La ruta ornitológica del valle de Bujaruelo es un buen punto de acceso a la alta montaña, donde la nieve y el frío imponen sus rigores a unas pocas aves muy especializadas.




### Gorrión alpino (*Montifringilla nivalis*)

Longitud: 17-19 cm

Envergadura: 34-38 cm

Residente

Ocupa praderas y canchales a más de 2.000 m de altitud pero en invierno baja al fondo del valle



### Perdiz pardilla (*Perdix perdix*)

Longitud: 29-31 cm

Envergadura: 45-48 cm

Residente

Abundante en Centroeuropa, pero amenazada al sur del Pirineo



### Perdiz nival (*Lagopus mutus*)

Longitud: 36-39 cm

Envergadura: 65-74 cm

Residente

Auténtica reliquia de las glaciaciones

## Curiosidades

### LAS MIGRACIONES Y LAS «TRASHUMANCIAS» DE LAS AVES

La migración es un fenómeno anual que lleva a las aves a efectuar grandes desplazamientos. Las principales razones para migrar son la búsqueda de alimento y reproducirse en un clima y entorno favorables. Además, existen pequeñas migraciones, típicas en los parajes de alta montaña, propiciadas por la dureza de la climatología. En Bujaruelo se puede observar como la chova piquigualda, el camachuelo y otras aves se trasladan a prados y bosques de menor altura cuando en invierno la nieve y el frío las dejan con muy pocas opciones en su alimentación. Así que, al modo de la trashumancia ganadera, multitud de aves también se desplazan en invierno desde su hábitat de alta montaña a cotas inferiores.

- Perdiz nival con su camuflaje invernal



## El bosque montano

En la margen derecha del río Ara, los prados húmedos pierden protagonismo a favor del bosque montano, con ejemplares de pinos, serbales, fresnos, mostajos, arces campestres y algún abeto. En este hábitat boscoso y con la proximidad de la ribera del Ara, se puede disfrutar de la observación de las aves de montaña como el **bisbita arbóreo** o el **bisbita alpino**, o ver planear al **quebrantahuesos**. Un punto de gran interés en esta parte del recorrido es la fuente de la Femalla.




### **Bisbita alpino (*Anthus spinoletta*)**

Longitud: 17 cm

Envergadura: 23-28 cm

Residente

Siempre alerta, camina deprisa y moviendo incesantemente la cola



### **Bisbita arbóreo (*Anthus trivialis*)**

Longitud: 15 cm

Envergadura: 25-27 cm

Estival

Canta mientras vuela hacia arriba y baja en «paracaídas» hasta un posadero elevado

### **Pinzón vulgar (*Fringilla coelebs*)**

Longitud: 15 cm

Envergadura: 25-28 cm

Residente

Muy habitual en España y en el Pirineo, prefiere los bosques húmedos y de ribera



### **Mirlo capiblanco (*Turdus torquatus*)**

Longitud: 24 cm

Envergadura: 38-42 cm

Residente

Similar al mirlo común, pero con una llamativa línea blanca en el pecho



## Ficha técnica

- **Hábitat ornitológico elegido:** bosques de coníferas del piso montano húmedo. Humedal en el embalse de Pineta
- **Comarca:** Sobrarbe
- **Municipio:** Bielsa
- **Longitud del itinerario:** 1 km 700 m la vuelta circular; 1 km 200 m (sólo ida) la derivación al embalse de Pineta
- **Tiempo:** 50 min la vuelta circular por el entorno de Bielsa; 25 min (sólo ida) la derivación al embalse de Pineta
- **Altitudes:** Bielsa (1.020 m), camino de servicio del Canal (1.130 m) y embalse de Pineta (1.150 m)
- **Desnivel acumulado:** 110 m de subida hasta el camino del Canal; 20 m de subida hasta el embalse de Pineta
- **Tipo de sendero:** la ruta discurre por senderos señalizados como PR y GR

- **Avifauna característica:** carbonero garrapinos, carbonero palustre, reyezuelo listado, reyezuelo sencillo, ánade real, mirlo acuático, mito, agateador norteño, pico picapinos, arrendajo, herrerillo capuchino, verderón serrano, chochín, petirrojo, azor, gavián, busardo ratonero...
- **Difíciles de ver:** picogordo, cárabo, pito negro, mochuelo boreal o lechuza de Tengmalm

Esta ruta ornitológica es un recorrido circular por el entorno de Bielsa, con una derivación hasta el embalse de Pineta. Transitando por el sendero señalizado PR-HU 137, que asciende hasta el camino de servicio del canal del Cinca, el itinerario se adentra por un frondoso bosque de pinos con multitud de aves. El mirador de Bielsa ofrece espléndidas vistas sobre el pueblo y la montaña, siendo un buen punto de observación de rapaces. El embalse de Pineta permite contemplar azulones y fochas, además de disfrutar de unas espléndidas vistas sobre el valle de Pineta.



## El bosque húmedo

A través del bosque de pinos del piso montaño húmedo, hay que habituarse a los pequeños sonidos del bosque y a la luz que se cuela entre las copas de los árboles. Los pequeños movimientos entre las ramas delatan la presencia de un ave. Atender a sus cantos puede ser otra gran ayuda para la localización e identificación de estas aves.



### Carbonero palustre (*Parus palustris*)

Longitud: 12 cm  
Envergadura: 19 cm  
Residente

Sólo puede observarse en el norte de la península Ibérica



### Reyezuelo sencillo (*Regulus regulus*)



Longitud: 9 cm  
Envergadura: 13-15 cm  
Invernante

Su peso corporal es de sólo ¡5 g!

### Picogordo (*Coccothraustes coccothraustes*)

Longitud: 18 cm  
Envergadura: 29-33 cm  
Residente e invernante

Difícil de ver, sólo en el Pirineo y durante inviernos fríos



### Agateador norteño (*Certhia familiaris*)

Longitud: 12,5 cm  
Envergadura: 18-20 cm  
Residente

Se pega a los troncos de los árboles, por los que trepa en busca de insectos

## Las rapaces del bosque

Además de las pequeñas aves forestales, también se pueden observar rapaces del bosque entre la espesura, como el azor o el gavián, o en los lindes, como el busardo ratonero. Menos abundantes y bien camufladas, su localización no es fácil dentro del bosque, por lo que es necesario suerte y paciencia.

### Azor (*Accipiter gentilis*)

Longitud: 58 cm  
Envergadura: 120 cm  
Residente

Su morfología está adaptada al vuelo dentro del bosque: alas cortas, pero anchas, y cola larga para maniobrar



### Cárabo (*Strix aluco*)

Longitud: 40 cm  
Envergadura: 95 cm  
Residente

Su oído capta los sonidos de baja frecuencia, detectando los pasos de los roedores



### Busardo ratonero (*Buteo buteo*)

Longitud: 57 cm  
Envergadura: 130 cm  
Residente

Se posa sobre postes de teléfono, de luz o vallas, desde donde otea el terreno y caza



### Gavián (*Accipiter nisus*)

Longitud: 37 cm  
Envergadura: 69 cm  
Residente

Caza mientras vuela a gran velocidad



## El embalse de Pineta

Este pequeño embalse del río Cinca ocupa el fondo de un valle de origen glaciar. Especies como los **ánades reales** o las **fochas** se localizan cerca de la vegetación de las orillas. Mientras, en el horizonte de las grandes montañas pirenaicas, los bosques de cotas más altas dan cobijo a algunas aves tan escasas y especiales como el **urogallo** o el **mochuelo boreal**.



### Ánade real (*Anas platyrhynchos*)

Longitud: 68 cm  
Envergadura: 90 cm  
Residente

**El macho tiene la cabeza verde, con collar blanco, y la hembra es pardo oscura**



### Mirlo acuático (*Cinclus cinclus*)

Longitud: 18 cm  
Envergadura: 25-30 cm  
Residente

**Buen bioindicador del estado de salud del ecosistema donde se encuentra**



### Focha (*Fulica atra*)

Longitud: 40 cm  
Envergadura: 80 cm  
Residente

**Habitual en lagunas, embalses o ríos de aguas tranquilas**

### Mochuelo boreal o lechuza de Tengmalm (*Aegolius funereus*)

Longitud: 27 cm  
Envergadura: 60-80 cm  
Residente / estacional

**Es el un búho de montaña por excelencia**



# La Espelunga



ruta 3

## Ficha técnica

- **Hábitat ornitológico elegido:** roquedo
- **Comarca:** Sobrarbe
- **Municipios:** El Pueyo de Araguás y La Fueva
- **Longitud del itinerario:** 2 km 600 m (sólo ida)
- **Tiempo:** 1 h (sólo ida)
- **Altitudes:** San Victorián (1.100 m), ermita de San Antón (1.155 m) y ermita de La Espelunga (1.350 m)
- **Desnivel acumulado:** 250 m de subida
- **Tipo de sendero:** el itinerario está señalizado como PR-HU 43

- **Avifauna característica:** quebrantahuesos, buitre leonado, águila real, alimoche, halcón peregrino, búho real, chova piquirroja y piquigualda, roquero rojo, treparriscos, cernícalo, vencejo real, avión roquero, grajilla, corneja, cuervo...

La ruta que llega hasta la ermita rupestre de La Espelunga está cargada de historia y leyendas. Desde el monasterio de San Victorián, atraviesa pequeños bosques de tipo mediterráneo y pedrizas, entre excelentes vistas de los alrededores, hasta llegar a palpar las imponentes paredes de la sierra Ferrera-Peña Montañesa. Permite observar las grandes rapaces, con los vuelos planeadores del buitre leonado, el quebrantahuesos, el águila real o el alimoche; contemplar y oír a las estridentes chovas; y ya en La Espelunga, bajo las paredes verticales, sorprender al roquero rojo y al treparriscos.



## Entre la ermita de San Antón y La Espelunga

Al poco de hincar la ruta, aparece la pequeña ermita de San Antón. Desde este punto se contempla todo el esplendor de la Sierra Ferrera-Peña Montañesa, por ello es un lugar ideal para la observación en altura de las grandes rapaces. Además de avistar estas y otras del roquedo, entre las que incluir al **halcón peregrino** o a las **chovas**, más adelante, en el bosque mediterráneo, se pueden ver pequeños pájaros forestales como el **carbonero garrapinos**, el **carbonero común** o el **verderón serrano**. Y hay especies que están presentes durante todo el recorrido, como el **cuervo**.



### Buitre leonado (*Gyps fulvus*)

Longitud: 95-110 cm  
Envergadura: 230-265 cm  
Residente

La más visible y abundante de las grandes aves carroñeras



### Quebrantahuesos (*Gypaetus barbatus*)

Longitud: 105-125 cm  
Envergadura: 235-275 cm  
Residente / **En peligro de extinción**

Buitre especializado en la ingesta de huesos

### Cuervo (*Corvus corax*)

Longitud: 54-67 cm  
Envergadura: 115-130 cm  
Residente

Es el más grande de la familia de los córvidos



### Mito (*Aegithalo caudatus*)

Longitud: 14 cm  
Envergadura: 16-19 cm  
Residente

Visible en grupos, la longitud de su cola es mayor que la del cuerpo



# Río Ara (Aínsa-Boltaña)




RUTA 4

## Ficha técnica

- **Hábitat ornitológico elegido:** hábitat de ribera (río Ara)
- **Comarca:** Sobrarbe
- **Municipios:** Aínsa-Sobrarbe y Boltaña
- **Longitud del itinerario:** 8 km 650 m
- **Tiempo:** 2 h (sólo ida)
- **Altitudes:** Aínsa (540 m), Margudgued (575 m) y Boltaña (590 m)
- **Desnivel acumulado:** 50 m de subida desde Aínsa
- **Tipo de sendero:** el itinerario está señalizado como PR-HU 186

- **Avifauna característica:** garza real, martín pescador, lavandera blanca, lavandera cascadeña, abejaruco, tórtola común, abubilla, perdiz roja, oropéndola, agateador común, milano real, gavilán, zorzal común, zorzal charlo, vencejo común, golondrina común, avión común, estornino negro, pito real, papamoscas gris, papamoscas cerrojillo, alimoche, busardo ratonero, buitre leonado, aguililla calzada...
- **Difíciles de ver:** codorniz, autillo, lechuza común o azor.

Esta ruta ornitológica conecta Aínsa y Boltaña siguiendo la margen derecha del río Ara, visitando, a la vez, Margudgued y el complejo hotelero Monasterio de Boltaña. Sin desniveles y totalmente ciclable, puede iniciarse en Aínsa, aprovechando la escollera y el Corredor Verde del Río Ara, o en Boltaña, junto al camping La Gorga. Los ecosistemas riparios son corredores biológicos que ayudan a filtrar los sedimentos arrastrados, regulan el clima, aseguran la estabilidad de las orillas, favorecen la dispersión y movilidad de las especies..., además de poseer un enorme valor paisajístico y recreativo.



## La ribera del río Ara en Aínsa

Desde el inicio del camino en Aínsa, el río Ara se muestra como el poderoso río de montaña que es. Constituye la mayor cuenca natural de la cordillera pirenaica y está catalogado, en buena parte, como Lugar de Importancia Comunitaria dentro de la Red Natura 2000. La vegetación ha ido colonizando espontáneamente amplias zonas de la escollera por donde discurre el primer tramo de la ruta, flanqueando, junto a algunos chopos, el cauce del río.



### Lavandera blanca (*Motacilla alba*)

Longitud: 18 cm  
Envergadura: 25-30 cm  
Residente

Mueve incesantemente su cola, muy alargada respecto al cuerpo



### Lavandera cascadeña (*Motacilla cinerea*)

Longitud: 17-19 cm  
Envergadura: 25-27 cm  
Residente

Similar a la lavandera blanca, cambia las partes blancas por amarillas



### Abejaruco (*Merops apiaster*)

Longitud: 27 cm  
Envergadura: 36-46 cm  
Estival

Evoca a llamativas especies de latitudes africanas, donde pasa el invierno



### Autillo (*Otus scops*)

Longitud: 20 cm  
Envergadura: 45-55 cm  
Residente

El búho más pequeño del Pirineo

## Los campos de labor

De espaldas al cauce del río Ara hay extensos campos de cereal antes de alcanzar los límites del bosque, compuesto básicamente de pinos. Se trata de espacios donde el hábitat de ribera y el del bosque mediterráneo se juntan e interactúan. Por eso, además de aves ribereñas, se pueden ver **abejarucos**, que han encontrado en algún talud su lugar de residencia, el ir y venir de los **aviones comunes**, o a los **papamoscas** entre la vegetación. También se puede contemplar a los escasos **milanos reales** cruzar los campos de cultivo entre la ribera y el bosque o las siluetas de los **buitres** y **alimoches**.



### Perdiz roja (*Alectoris rufa*)

Longitud: 40 cm  
Envergadura: 50-60 cm  
Residente

La caza intensiva y el abandono de la agricultura de montaña provocan su merma

### Cogujada común (*Galerida cristata*)

Longitud: 17 cm  
Envergadura: 30-35 cm  
Residente

Camina o corre con su llamativa cresta extendida



### Milano real (*Milvus milvus*)

Longitud: 65 cm  
Envergadura: 170 cm  
Residente

Se deja ver en huertas, bordas y parideras, donde hay ganado y presencia de roedores



Difícil de ver

### Codorniz (*Coturnix coturnix*)

Longitud: 18 cm  
Envergadura: 32-35 cm  
Estival

Difícil de observar, pero fácil de oír, ya que emite un repetitivo «pit, pit, pit»



## La ribera del río Ara en Boltaña


Con la ayuda de los prismáticos será fácil localizar las **lavanderas** en las rocas próximas al agua y si estamos atentos a los vuelos rápidos y rasantes cerca de las orillas habremos descubierto al **martín pescador**. La **garza real** será mejor buscarla en zonas con algún remanso. Siempre hay aves de paso, quizá la **tórtola** se cruce en nuestras observaciones, o tal vez sea el **pito real** el que nos llame la atención con su llamativo canto desde alguna zona boscosa próxima.



### Tórtola común (*Streptopelia turtur*)

Longitud: 26 cm  
Envergadura: 47-53 cm  
Estival

A cientos de metros, su «arrullo» recuerda a un mantra constante y acogedor



### Garza real (*Ardea cinerea*)

Longitud: 105 cm  
Envergadura: 195 cm  
Residente

Immóvil en la orilla, para no ser vista por sus presas, los peces, aunque es omnívora



### Pito real (*Picus viridis*)

Longitud: 36 cm  
Envergadura: 40-42 cm  
Residente

Pájaro carpintero fácil de ver y de escuchar, con un canto en forma de relincho

### Martín pescador (*Alcedo atthis*)

Longitud: 16 cm  
Envergadura: 24-26 cm  
Residente

Muy vistoso, realiza vuelos rectilíneos cruzando el río a gran velocidad



# Congosto de El Entremón



ruta 5

## Ficha técnica

- Hábitat ornitológico elegido:** roquedo
- Comarca:** Sobrarbe
- Municipios:** Abizanda y Palo
- Longitud del itinerario:** 2 km 600 m hasta el final del congosto (sólo ida)
- Tiempo:** 1 h hasta el final del congosto (sólo ida)
- Altitudes:** aparcamiento (460 m); final del desfiladero de El Entremón (480 m)
- Desnivel acumulado:** 40 m de subida y 20 m de bajada
- Tipo de sendero:** la ruta está señalizada con las marcas blancas y rojas del sendero GR 1 (Sendero Histórico)

- Avifauna característica:** quebrantahuesos, buitre leonado, águila real, alimoche, halcón peregrino, búho real, cernícalo, chova piquirroja, avión común, avión roquero, vencejo real, grajilla, corneja, cuervo, treparriscos, mirlo, paloma bravía, gorrión chillón, arrendajo, collalbas...



Es un recorrido sin dificultades, sin embargo debe hacerse con MUCHO CUIDADO para no resbalar, pues a veces discurre cerca del precipicio. Es muy importante no ir con prisas ni salirse del sendero marcado.

El congosto de El Entremón es un desfiladero entre montañas tallado en la roca que encauza el río Cinca entre los embalses de Mediano y El Grado. La ruta aprovecha un camino tradicional, trazado por la margen orográfica izquierda del río, exclusivamente peatonal, sin apenas desniveles, en parte tallado en las paredes calizas y que atraviesa pedrizas y bosquetes de tipo mediterráneo algo húmedos. Es un recorrido ideal para la observación ornitológica de aves propias de los roquedos. Además se puede observar el vuelo planeador de las grandes rapaces o el paso de otras muchas sobre el río.

## Cueva de las Palomas

Al inicio de la ruta, la cueva de las Palomas alude en su nombre a la presencia de estas aves en algún momento. Hoy en día, está en parte inundada por la cola del embalse de El Grado, y esta oquedad y sus alrededores acogen ahora a especies rupícolas como las **chovas piquirrojas** o los **aviones**. Arriba, sobre los farallones dominando el entorno, se ubica el conjunto medieval formado por el castillo y la ermita románica de los santos Emeterio y Celedonio de Samitier.



### Avión común (*Delichon urbica*)

Longitud: 12-13 cm

Envergadura: 26-29 cm

Estival

Muy gregario, nidifica tanto en edificios como en los roquedos



### Avión roquero (*Ptyonoprogne rupestris*)

Longitud: 14-15 cm

Envergadura: 30-32 cm

Estival

Similar al avión común, aunque más silencioso, cría en los acantilados



### Paloma bravía (*Columba livia*)

Longitud: 30-35 cm

Envergadura: 62-68 cm

Residente

Cría con frecuencia en cuevas y acantilados


### Chochín (*Troglodytes troglodytes*)

Longitud: 9-10 cm

Envergadura: 13-17 cm

Residente

Pájaro diminuto que levanta su pequeña cola casi verticalmente



## Paso de la Media Caña

Hace referencia a la curiosa oquedad semicircular que atraviesa el sendero en un tramo de roca excavada por el hombre. Este paso da entrada a un pequeño bosque mediterráneo de encinas, lentiscos, robles, algunos madroños, olivilla, sabinas, enebros... Aquí, la vegetación recoge la humedad propiciando un «microhábitat» en medio del roquedal que le permite acoger a las pequeñas aves forestales.



### Herrerillo capuchino (*Parus cristatus*)

Longitud: 10,5-12 cm  
Envergadura: 17-20 cm  
Residente

Reconocible por su cresta siempre visible



### Herrerillo común (*Parus caeruleus*)


Longitud: 10,5-12 cm  
Envergadura: 17-20 cm  
Residente

Es fácil verlo colgado boca abajo en las ramas en busca de comida

### Carbonero común (*Parus major*)

Longitud: 13-15 cm  
Envergadura: 22-25 cm  
Residente

Suele anidar en los huecos de los árboles



### Mosquitero común (*Phylloscopus collybita*)

Longitud: 10-12 cm  
Envergadura: 15-21 cm  
Residente

Su nido es como una pequeña bolsa redondeada que cuelga de las ramas

## Cerca del río

Las pedrizas, esa especie de cascada de rocas de todos los tamaños, que se desprenden del Tozal de Palo o cerro de Santa Bárbara obligan al camino a discurrir por la ribera del río Cinca. En este tramo final de la ruta, en el que se ensancha el cauce, podemos observar cómo la frondosa vegetación propia de las márgenes fluviales toma protagonismo. Así que tenemos oportunidad de avistar, a la vez, aves de ribera, de roquedo, forestales y aves de paso.

### Verderón común (*Carduelis chloris*)

Longitud: 14-16 cm  
Envergadura: 25-27 cm  
Residente

Habitual de los bosques y de las choperas al lado de los ríos



### Mirlo común (*Turdus merula*)

Longitud: 23-29 cm  
Envergadura: 34-38 cm  
Residente

Con su silueta esbelta y su cola larga, camina dando saltos

### Ruiseñor común (*Luscinia megarhynchos*)

Longitud: 15-16 cm  
Envergadura: 23-26 cm  
Estival

Llega en marzo desde África y permanece hasta septiembre



### Petirrojo (*Erithacus rubecula*)

Longitud: 12-14 cm  
Envergadura: 20-22 cm  
Residente

Hincha su pecho cuando se siente amenazado

# Río Ésera (Castejón de Sos-Sesué/Villanova)



ruta 6

## Ficha técnica

**Hábitat ornitológico elegido:** bosque de ribera y prados ganaderos delimitados por orla arbórea

**Comarca:** La Ribagorza

**Municipios:** Castejón de Sos y Sesué

**Longitud del itinerario:** 4 km 600 m


**Tiempo:** 1 h 15 min (hasta Sesué)

**Altitudes:** Castejón de Sos (910 m) y puente carretero sobre el Ésera (940 m)

**Desnivel acumulado:** 50 m de subida y 20 m de bajada desde Castejón de Sos

**Tipo de sendero:** itinerario señalizado como PR-HU 86

- **Avifauna característica:** curruca capirotada, cormorán grande, andarríos chico, gaviota patiamarilla, oropéndola, escribano cerillo, papamoscas cerrojillo, papamoscas gris, alcaudón, garza real, martín pescador, lavandera blanca, lavandera cascadeña, tórtola común, avión común, mirlo, carbonero, herrerillo, arrendajo, zorzal común y charlo, milano real, busardo ratonero, alimoche, águila real, aguililla calzada...
- **Difíciles de ver:** chotacabras europeo, búho chico, críalo o colirrojo real.



Esta ruta por la ribera del Ésera, entre Castejón de Sos y las inmediaciones de Sesué y Villanova, permite disfrutar del potencial y diversidad de un río de montaña, con un elevado valor ornitológico. En las cercanías de Castejón de Sos se atraviesan prados delimitados por densas orlas de vegetación. El tramo intermedio se adentra en una frondosa vegetación, acercándose a la orilla del río. Otro buen punto de observación de aves es el embalse de Sesué. El otro extremo de la ruta, el puente carretero sobre el Ésera, invita a visitar las bonitas localidades de Sesué o Villanova.

## Los prados ganaderos

En las zonas de prados y orlas vegetales de los llanos de Castejón de Sos habitan los mirlos, los zorzales y los arrendajos. En las noches de verano y con un poco de suerte, también se puede ver al chotacabras. Comunes son los escribanos, como el cerillo, los colirrojos y las currucas, como la capriotada. También es un hábitat propicio para el milano real o el busardo ratonero. En invierno suelen bajar especies de alta montaña, como las chovas o los camachuelos. Y en época estival es fácil ver cómo los alimoche se acercan para conseguir comida.

### Escribano cerillo (*Emberiza citrinella*)

Longitud: 16,5 cm  
Envergadura: 23-29 cm  
Residente

Su pico corto denota que es una especie granívora estricta



### Colirrojo real (*Phoenicurus phoenicurus*)

Longitud: 14 cm  
Envergadura: 22-24 cm  
Estival

Posado, es característico su vaivén rápido de la cola



### Curruca capriotada (*Sylvia atricapilla*)

Longitud: 13 cm  
Envergadura: 20-23 cm  
Residente

El capirote de su cabeza es negro en los machos y marrón en las hembras



### Difícil de ver Chotacabras europeo (*Caprimulgus europaeus*)

Longitud: 27 cm  
Envergadura: 52-59 cm  
Estival

De forma ocasional puede observarse de noche, tumbado sobre los caminos



## El bosque de ribera

Dentro del término municipal de Sesué, la ruta transita entre una frondosa vegetación de ribera y también por un tupido bosque de robles que se enraíza elevado sobre las orillas del río Ésera. En el tránsito de los prados a las zonas con mayor abundancia de vegetación son habituales los carboneros y herrerillos, papamoscas grises y papamoscas cerrojillos en sus movimientos rápidos. Se puede escuchar el canto del cuco y sorprender al alcaudón con una de sus presas. Y aunque es difícil de ver por sus hábitos nocturnos, es posible avistar algún búho chico.



### Cuco (*Cuculus canorus*)

Longitud: 32-36 cm  
Envergadura: 54-60 cm  
Estival

No construye nidos, sino que parasita los de otras especies



### Alcaudón común (*Lanius senator*)

Longitud: 18 cm  
Envergadura: 26-28 cm  
Estival

Aún siendo fundamentalmente insectívoro, es capaz de cazar roedores y lagartijas

Difícil de ver

### Búho chico (*Asio otus*)

Longitud: 31-37 cm  
Envergadura: 86-98 cm  
Residente

Sus aparentes «orejas» no son más que penachos de plumas



Difícil de ver

### Críalo (*Clamator glandarius*)

Longitud: 35-39 cm  
Envergadura: 54-60 cm  
Estival

Pariente del cuco, parasita los nidos de la urraca

## El mirador sobre el Ésera

Centrando la vista sobre el río y el embalse de Sesué, se pueden avistar las aves acuáticas más típicas, como el cormorán grande, la garza real, la gaviota patiamarilla, las lavanderas o el andarríos chico. Camuflados y en silencio, es posible que sorprender el vuelo rápido y cercano al agua del martín pescador o el llamativo color amarillo chillón de la oropéndola. Éste también es un buen lugar para observar aves de paso y no es extraño avistar migraciones de patos, grullas o milanos negros.




**Cormorán grande (*Phalacrocorax carbo*)**

Longitud: 80-100 cm

Envergadura: 130-160 cm

Residente

**Especie marina que ha sido atraída por los embalses**



**Andarríos chico (*Actitis hypoleucos*)**

Longitud: 19,5 cm

Envergadura: 32-35 cm

Residente

**Se mueve habitualmente por las orillas del río, sobre las playas de grava**

**Gaviota patiamarilla (*Larus michaellis*)**

Longitud: 55-67 cm

Envergadura: 130-158 cm

Residente

**Su presencia responde a la construcción de embalses y a la suelta de peces exóticos**



**Oropéndola (*Oriolus oriolus*)**

Longitud: 24 cm

Envergadura: 45 cm

Estival

**Espectacular ave cuyo canto y colorido nos traslada a la sabana húmeda africana**

# Bosque de Pegá (Alto de Bonansa)




ruta  
7

## Ficha técnica

- **Hábitat ornitológico elegido:** bosque caducifolio y de coníferas de montaña
- **Comarca:** La Ribagorza
- **Municipio:** Laspaules
- **Longitud del itinerario:** 3 km
- **Tiempo:** 45 min (sólo ida)
- **Altitudes:** Alto de Bonansa (1.360 m), refugio de Pegá (1.430 m) y borda de Ansuilo (1.485 m)
- **Desnivel acumulado:** 125 m de subida
- **Tipo de sendero:** pista forestal de acceso restringido para vehículos


- **Avifauna característica:** pinzón vulgar, reyezuelo listado, papamoscas gris, papamoscas cerrojillo, alimoche, escribano montesino, pico picapinos, mito, mosquitero común, mirlo común, chochín, agateador común, carbonero común, abubilla, trepador azul, arrendajo, petirrojo, corneja negra...
- **Raras o muy difíciles de ver:** urogallo, quebrantahuesos, águila real o pito negro

A escasos 200 m del Alto de Bonansa, se inicia esta ruta ornitológica que atraviesa un frondoso bosque pirenaico: el bosque de Pegá. El itinerario coincide con una tranquila pista forestal que discurre en suave subida, en torno a los 1.400 m de altitud, entre pinar y hayedo. Termina llegando a la borda de Ansuilo y a un impresionante mirador sobre el valle del río Isábena que nos ofrece hermosas vistas hacia el congosto de Obarra, al sur, y las grandes cumbres de La Ribagorza, al norte.



## El bosque de pinos

Pegá es un bosque montano húmedo mixto de caducifolias y coníferas. En la primera parte de la ruta hay algunos abetos pero, sobre todo, pinos silvestres, entre los que habitan multitud de pequeñas aves. Entre las aves forestales que habitan el bosque de pinos y abetos encontramos algunos pájaros carpinteros como el **pico picapinos**, pequeños insectívoros como el **papamoscas** o el **mosquitero**, además de **herrerillos** y **carboneros**. Mención aparte merece el **urogallo**, especie emblemática del Pirineo, en peligro de extinción y muy difícil de ver.



### Papamoscas gris (*Muscicapa striata*)

Longitud: 15 cm  
Envergadura: 24 cm  
Estival

Para anidar elige cavidades de árboles



### Carbonero garrapinos (*Parus ater*)

Longitud: 11,5 cm  
Envergadura: 20 cm  
Residente

Es una de las especies que mejor acepta las cajas nido



### Pico picapinos (*Dendrocopos major*)

Longitud: 23-26 cm  
Envergadura: 38-44 cm  
Residente

Se le escucha martillar los troncos a finales de invierno y durante la primavera

Difícil de ver

### Urogallo (*Tetrao urogallus*)

Longitud: 55-90 cm  
Envergadura: 70-125 cm  
Residente / En peligro de extinción

Una reliquia de las glaciaciones



## El refugio de Pegá

Dejando atrás los dominios del pino, comienza el del hayedo, con presencia de serbales, avellanos, cerezos silvestres y arces campestres. A mitad de la ruta, en este entorno del refugio forestal de Pegá destaca también la presencia de pequeños prados destinados a pastos ganaderos. Si la densidad del hayedo dificulta en ocasiones la localización de las aves más pequeñas, en los espacios más abiertos, se puede avistar más fácilmente al **papamoscas cerrojillo** y al **pinzón vulgar**, algún pájaro carpintero como el tímido **pito negro**, al pequeño **reyzuelo listado** o al curioso **mito**.



**Papamoscas cerrojillo**  
(*Ficedula hypoleuca*)

Longitud: 13 cm  
Envergadura: 22-24 cm  
Residente

Ligado a los bosques de ribera y a bosques abiertos con prados de siega

**Reyzuelo listado** (*Regulus ignicapilla*)

Longitud: 10 cm  
Envergadura: 13-16 cm  
Residente

Captura insectos en cernidos vuelos que recuerdan a los del colibrí



**Pito negro** (*Dryocopus martius*)

Longitud: 46 cm  
Envergadura: 64-68 cm  
Residente

Su sonido, al golpear los troncos, puede oírse hasta a dos kilómetros de distancia

**Arrendajo** (*Garrulus glandarius*)

Longitud: 35 cm  
Envergadura: 57 cm  
Residente

Este córvido espectacular es el «chivato» del bosque



## Del hayedo al mirador de la borda de Ansuilo

El tramo final de la ruta llevará hasta los prados de la borda de Ansuilo. Allí, sólo los bojes y algunos árboles salpican los pequeños prados que bordean el sorprendente mirador natural de Ansuilo. En las grandes hayas, recorriendo su tronco cabeza abajo, podremos encontrar al **trepador azul**. Más adelante quizá se vean otras aves interesantes de montaña como el **escribano montesino**. Y en el mirador debemos buscar con los prismáticos las grandes rapaces en vuelo: **quebrantahuesos**, **buitre leonado**, **águila real** y **alimoche**.



### Escribano montesino (*Emberiza cia*)

Longitud: 16 cm  
Envergadura: 22-27 cm  
Residente

Habitual en los linderos, donde aparece de repente sobre una rama o piedra



### Trepador azul (*Sitta europaea*)


Longitud: 13 cm  
Envergadura: 22-27 cm  
Residente

Pequeño y rechoncho escalador de árboles

### Abubilla (*Upupa epops*)

Longitud: 26-28 cm  
Envergadura: 44-48 cm  
Estival

Para defender sus nidos acumula en ellos pestilentes heces



### Curiosidades

#### LA PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA ¿SABÍAS QUÉ ES UNA ZEPA?

Estas siglas corresponden a Zona de Especial Protección para las Aves. En 1992 todos los países de la Unión Europea se comprometieron a crear una red de espacios naturales protegidos para preservar el medio ambiente y su biodiversidad: es la llamada Red Natura 2000. Dentro de esta Red están los LIC (Lugares de Importancia Comunitaria) y las ZEPA. Estas Zonas de Especial Protección para las Aves pretenden preservar los hábitats donde hay una presencia importante o destacada de aves para así garantizar su conservación. En Aragón casi la quinta parte del territorio (17,8%) está amparada bajo esta figura de protección. El recorrido por el bosque de Pegá se incluye en la ZEPA «El Turbón y Sierra de Sis», con más de 24.000 hectáreas de superficie.

# Barranco Lafont



ruta 8

## Ficha técnica

- **Hábitat ornitológico elegido:** campos de cultivo y zonas urbanizadas
- **Comarca:** La Ribagorza
- **Municipio:** Arén
- **Longitud del itinerario:** 2 km 400 m
- **Tiempo:** 45 min (ruta circular)
- **Altitudes:** inicio ruta en Arén (705 m) y corral de Sasó (810 m)
- **Desnivel acumulado:** 105 m de ascenso y los mismos de descenso
- **Tipo de sendero:** recorrido circular señalado como PR-HU 46

- **Avifauna característica:** abejaruco, culebrera europea, buitre leonado, escribano montesino, curruca rabilarga, golondrina común, pico picapinos, avión común, mirlo común, chova piquirroja, mito, herrerillo común, carbonero común, tórtola común, tórtola turca, vencejo común, lavandera blanca, estornino negro, gorrión común...
- **Difíciles de ver:** gavián, cárabo, autillo o lechuza común

Con inicio y final en Arén, un tramo del recorrido discurre por la margen izquierda del barranco de Lafont, aprovecha el camino de herradura que durante siglos comunicó Arén con Iscles. Por la orilla contraria, el otro tramo aprovecha un tramo de pista forestal que visita el pilaret y el robleal de La Creueta. El punto de conexión de los dos sectores del camino se sitúa en el corral de Sasó, lugar donde se cruza el barranco Lafont. Desde ese punto se desvía el camino que va al yacimiento paleontológico de Blasi y al despoblado de Iscles.



## Huertos, antiguos cultivos y el robledal

Los huertos marcan la transición entre la zona habitada en Arén y los campos de cultivo, hoy abandonados en su gran mayoría. Aquí se encuentran **golondrinas**, **vencejos**, **gorriones**, **palomas** o **estorninos**. Entre los campos de cultivo se puede avistar algún **cernícalo**, **tórtolas**, **abubillas**, **codornices** o **abejarucos**, y quizá el vuelo vigilante del **águila culebrera** o de algún **buitre**. La pista de La Creueta nos traslada de nuevo a Arén atravesando un espléndido robledal, donde escuchar el repicar del **pico picapinos**, el canto del **mirlo** y los vuelos nerviosos de los pequeños **carboneros** y **herrerillos**.



### **Golondrina común** (*Hirundo rustica*)

Longitud: 18 cm  
Envergadura: 33 cm  
Estival

A causa del cambio climático,  
está modificando sus fechas de  
llegada y regreso a África

### **Curruca rabilarga** (*Sylvia undata*)

Longitud: 12-13 cm  
Envergadura: 13-19 cm  
Residente

Con una cola de 6 cm, da la impresión de que  
está desproporcionada



Difícil de ver

### **Lechuza común** (*Tyto alba*)

Longitud: 33-39 cm  
Envergadura: 80-95 cm  
Residente

Se alimenta de ratones, siendo  
buena aliada de agricultores y  
hombres del campo

### **Vencejo común** (*Apus apus*)

Longitud: 17 cm  
Envergadura: 42-48 cm  
Estival

Captura sus presas, principalmente mosquitos,  
mientras vuela



# Los Templarios



ruta 9

## Ficha técnica

- Hábitat ornitológico elegido:** pinar de repoblación y campos de cultivo
- Comarca:** La Ribagorza
- Municipio:** Graus
- Longitud del itinerario:** 5 km 500 m (desde la plaza de San Miguel hasta el camping de Regrustán)
- Tiempo:** 2 h (desde la plaza de San Miguel hasta el camping de Regrustán)
- Altitudes:** plaza S. Miguel (470 m), mirador Las Planas (630 m), ermita de Los Templarios (665 m) y camping Regrustán (460 m)
- Desnivel acumulado:** 205 m de subida y 215 m de bajada desde la plaza de San Miguel
- Tipo de sendero:** la ruta se corresponde con los senderos señalizados PR-HU 211 y GR 1

- Avifauna característica:** cogujada montesina, avión común, paloma torcaz, estornino negro, tórtola turca, cernícalo vulgar, pico picapinos, avión común, mirlo común, chova piquirroja, mito, herrerillos, carboneros, tórtola común, tórtola turca, vencejo común, lavandera blanca, estornino negro, gorrión común, petirrojo, cuco, arrendajo, abubilla, abejaruco, mochuelo...
- Difíciles de ver:** gavián, cárabo, autillo o lechuza común.

Este itinerario circular tiene su origen y final en la plaza de San Miguel de la localidad de Graus. Presenta dos tipos de hábitat bien diferenciados: el pinar de repoblación y los campos de cultivo. Aves asociadas a los campos de cultivo abandonados son la cogujada montesina, la abubilla, los mirlos o las chovas piquirrojas. En el pinar habitan petirrojos, carboneros, herrerillos, mitos, picos picapinos y alguna rapaz, como el gavián. Y en los campos de cultivo, con más presencia humana, se avistan palomas torcazes, estorninos, aviones, gorriones, cernícalos y, con un poco de suerte, alguna rapaz nocturna, como el autillo o la lechuza común.



## Entre el mirador de Las Planas y la ermita de Los Templarios

El estupendo mirador sobre el llano de Graus y el final del valle del Isábena muestra un amplio horizonte de montañas pirenaicas, como Cotiella, la sierra de Sis o el Turbón.

El tramo intermedio de la ruta atraviesa un bosque de pinos silvestres de repoblación, La Ubaga, zona umbría, donde también se puede encontrar boj, algunos robles y arces de Montpellier. Cerca de la ermita rómica de Los Templarios, que da nombre a esta ruta ornitológica, la vegetación es de monte bajo y campos de cultivo. En el roquedo de cotas superiores anidan rupícolas y es fácil observar buitres.



### Cogujada montesina (*Galerida theklae*)

Longitud: 17 cm  
Envergadura: 28-32 cm  
Residente

Coloniza las parcelas degradadas por el abandono de la agricultura y el sobrepastoreo

### Paloma torcaz (*Columba palumbus*)

Longitud: 41 cm  
Envergadura: 75-80 cm  
Residente

Es la paloma más grande de Europa



### Estornino negro (*Sturnus unicolor*)

Longitud: 22 cm  
Envergadura: 37-42 cm  
Residente

Especie gregaria, la formación de grupos es un sistema de defensa

### Cernícalo vulgar (*Falco tinnunculus*)

Longitud: 34-39 cm  
Envergadura: 65-80 cm  
Residente

Para cazar, acostumbra a quedarse quieto en el aire, cerniéndose






## Ficha técnica

- **Hábitat ornitológico elegido:** roquedo
- **Comarca:** La Ribagorza
- **Municipio:** Viacamp y Litera
- **Longitud del itinerario:** 3 km 800 m (sólo ida)
- **Tiempo:** 1h 45 min (sólo ida)
- **Altitudes:** Collado de Ramis (908 m), Pas de San Miquel (1.235 m) y cumbre-vértice del Montsec (1.331 m)
- **Desnivel acumulado:** 443 m de subida y 20 m de bajada
- **Tipo de sendero:** la ruta está señalizada como PR-HU 200

● **Avifauna característica:** quebrantahuesos, buitre leonado, águila real, aguililla calzada, culebrera europea, alimoche, halcón peregrino, vencejo real, chova piquigualda, chova piquirroja, búho real, treparriscos, roquero rojo, piquirroja, búho real, treparriscos, roquero rojo, roquero solitario, cernícalo vulgar, collalba gris, grajilla, corneja negra, cuervo, curruca rabilarga, curruca carrasqueña...

El Montsec de Aragón en su cara sur se presenta como una mole de piedra con desniveles que superan los 300 metros de caída vertical. La ruta se inicia en el collado de Ramis y aprovecha un camino tradicional, que asciende a lo alto de la sierra del Montsec. Las verticales paredes calizas dibujan el más puro paisaje mediterráneo con el roquedo como hábitat fundamental. El último tramo permite observar el vuelo de las rapaces a la altura de los ojos y, llegados a los 1.331 m de altitud de la cima del Montsec, contemplar el profundo acantilado que separa Aragón de Cataluña.



## La subida al Montsec

El Montsec es un territorio de rocas y de rapaces. Conforme se gana altura, aumentan las posibilidades de avistar ante nosotros los vuelos planeadores de las aves de presa. Estamos en el hábitat del **águila real**, el **buitre leonado**, el **águila culebrera**, el **halcón peregrino** y el **quebrantahuesos**.



### Águila real (*Aquila chrysaetos*)

Longitud: 75-95 cm

Envergadura: 180-230 cm

Residente

**Poderosa, vuela a gran altura para localizar sus presas terrestres**

### Culebrera europea (*Circaetus gallicus*)

Longitud: 62-69 cm

Envergadura: 160-175 cm

Estival

**Forma de vuelo característica: «pico a viento», es decir, en contra del viento**



### Halcón peregrino (*Falco peregrinus*)

Longitud: 38-50 cm

Envergadura: 90-115 cm

Residente

**Record de velocidad del reino animal: 300 km/h en fuertes picados**



Difícil de ver

### Búho real (*Bubo bubo*)

Longitud: 57-75 cm

Envergadura: 140-188 cm


Residente

**Uno de los mejores cazadores, por su gran tamaño y el sigilo con el que vuela**



## El Pas de San Miguel

Antes del Pas de San Miguel, situado a 1.235 m, se accede a la divisoria del Montsec de Aragón. A la altura de los últimos farallones calizos se puede buscar el vuelo ondulante del **treparriscos**, entre los gritos estridentes de las **chovas**. Sobre el horizonte se dibujan las figuras de las grandes carroñeras, el **quebrantahuesos**, el **buitre leonado** o el **alimoche**. La presencia de otras rapaces es muy habitual, como por ejemplo, el **águila real** o la **aguililla calzada**.



### Aguililla calzada (*Hieraaetus pennatus*)

Longitud: 42-51 cm

Envergadura: 110-135 cm

Estival

Esta bella rapaz tiene una característica muy peculiar: ejemplares claros y oscuros



### Chova piquirroja (*Pyrhocorax pyrrhocorax*)

Longitud: 37-41 cm

Envergadura: 68-80 cm

Residente

De la familia de los cuervos, es inconfundible por sus patas y pico rojos

### Chova piquigualda (*Pyrhocorax graculus*)

Longitud: 36-39 cm

Envergadura: 65-74 cm

Residente

De alta montaña, su pico amarillo y una cola más larga la diferencian de la piquirroja



### Difícil de ver Treparriscos (*Tichodroma muraria*)

Longitud: 17 cm

Envergadura: 27-32 cm

Estival

Su vuelo es grácil como el de una mariposa

## El acantilado del Montsec

Desde la cima de la sierra del Montsec, sobre los vertiginosos farallones de la sierra, se muestra el Montsec aragonés y catalán y el embalse de Canelles, en el río Noguera Ribagorzana. Hacia el norte, se obtienen unas magníficas vistas panorámicas de casi todas las cumbres pirenaicas. Contemplar el vuelo de los **buitres** y **alimoches**, es un privilegio único. Este es el dominio de las grandes rapaces, entre las que sobresale la presencia fugaz del **quebrantahuesos**. Desde marzo a octubre el silencio se ve roto por el rápido vuelo de los **vencejos reales**.



### **Alimoche (*Neophron percnopterus*)**

Longitud: 55-65 cm

Envergadura: 150-170 cm

Estival

**Este pequeño buitre llega desde África en febrero, a donde vuelve en septiembre**



### **Vencejo real (*Apus melba*)**

Longitud: 21 cm

Envergadura: 57 cm

Estival

**Se observa en grupos, sobrevolando zonas de cortados en alta y media montaña**


### **Roquero rojo (*Monticola saxatilis*)**

Longitud: 19 cm

Envergadura: 33-37 cm

Estival

**Mantiene ciertas actitudes confiadas, lo cual facilita su observación**



Difícil de ver

### **Roquero solitario (*Monticola solitarius*)**

Longitud: 22 cm

Envergadura: 33-37 cm

Residente

**Solitario, de color azul cobalto, vuela rápido de roca en roca**

## Recomendaciones



Se recomienda llevar calzado adecuado para travesía o montaña.



No molestar a las aves, evitando acercarse en exceso, en especial en época de reproducción.



¡No olvidéis los prismáticos y la guía de aves!



Recordad que puede ser difícil ver algunas aves, en la naturaleza no hay garantías.



Para disfrutar del entorno y no molestar a las aves, es muy recomendable caminar en silencio y evitar ruidos o gritos innecesarios.



Está completamente prohibido encender fuego.



Cuidad la vegetación, no arranquéis plantas.



Revisad vuestro equipo: agua, ropa de abrigo, gorra para el sol...



Recoged vuestra basura.

## SEÑALIZACIÓN

La mayoría de estos 10 recorridos ornitológicos discurren por senderos de Pequeño Recorrido (PR) o Gran Recorrido (GR), excepto la nº 7, que presenta solo la señalización propia de las rutas ornitológicas. Por tanto, el logotipo identificativo de las rutas ornitológicas por Sobrarbe y La Ribagorza marca en todo momento cada uno de los recorridos, bien sea como un añadido a las diferentes señales verticales de los GR y PR, bien como un icono particular en el caso mencionado. La incorporación de la señalización de los GR y PR garantiza, además, el feliz recorrido por los senderos, al ser conocida y empleada internacionalmente.

